

PATIËNTEN INFORMATIE

Hevig bloedverlies bij de menstruatie

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Inhoud

Wat is hevig bloedverlies en hoe vaak komt het voor.....	4
Oorzaken	4
Welke onderzoeken zijn mogelijk	6
Gynaecologisch onderzoek	6
Bloedonderzoek.....	6
Echoscopisch onderzoek	6
Hysteroscopisch onderzoek.....	6
Curettagage	7
Welke behandelingen zijn mogelijk.....	7
Medicijnen: niet-hormonen	8
Prostaglandine-synthetase-remmers (onder andere diclofenac, ibuprofen, indometacine, naproxen).....	8
Tranexaminezuur (Cyklokapron®)	8
Medicijnen: hormonen	9
De pil.....	9
De prikpil	9
Progesteronpreparaten	10
Danazol	10
LH/RH-agonisten	10
Progesteroncapsule (Mirena-spiraaltje)	11
Operatieve behandelingen van het baarmoederslijmvlies.....	11
Operatieve verwijdering van de baarmoeder (hysterectomie of uterusextirpatie).....	12
Zelfhulporganisaties	12

Verder lezen	13
Woordenlijst.....	13
Beslissing over behandeling.....	14
Vragen	14

Met deze folder willen we u informeren over hevig bloedverlies bij de menstruatie, de oorzaken, onderzoek en behandelmogelijkheden. Er wordt niet ingegaan op onregelmatig bloedverlies, tussentijds bloedverlies, bloedverlies na de overgang, of bloedverlies na de gemeenschap. Aan het eind van de folder vindt u een verklarende woordenlijst.

Wat is hevig bloedverlies en hoe vaak komt het voor

Hevig bloedverlies betekent voor elke vrouw iets anders. Sommige vinden bloedverlies hevig als het meer is dan zij gewend zijn; anderen noemen het hevig omdat zij veel tampons of maandverband nodig hebben, doorlekken, en zich zeer vaak moeten verschonen.

Een precieze definitie van hevig bloedverlies is er niet. Verlies van stolsels (dikke brokken) en bloedarmoede zien we meestal als kenmerken van hevig bloedverlies. Of hevig bloedverlies een reden is tot verder onderzoek en eventuele behandeling, hangt af van uw klachten.

U bent degene die aangeeft of verder onderzoek nodig is. Hevig bloedverlies is vervelend, maar kan meestal geen kwaad. Alleen als u bloedarmoede heeft, adviseert de arts vaak wel behandeling. Sommige vrouwen menstrueren al van jongs af aan hevig. Zij weten bijna niet anders en hebben vaak geleerd ermee te leven. Voor veel vrouwen ontstaat de klacht na hun 30e of 40e jaar, soms na het stoppen van de pil.

Hevig bloedverlies heeft verschillende oorzaken, die ieder een andere aanpak vragen. Men schat dat zo'n 10-15% van de vrouwen er last van heeft en medische hulp zoekt.

Oorzaken

De hoeveelheid menstruatiebloed is onder andere afhankelijk van de dikte van het opgebouwde baarmoederslijmvlies. Door de eierstokken gemaakte hormonen verzorgen de opbouw van dit slijmvlies. Bij een daling van de hormoonspiegel stoot de baarmoeder het slijmvlies

af. Hierbij ontstaat een bloeding: de menstruatie. Als de overgang dichterbij komt, maken de eierstokken onregelmatiger hormonen. Daardoor wordt soms heel veel slijmvlies opgebouwd, dat bij afstoting een sterke bloeding geeft. Bij pilgebruik blijft het slijmvlies vaak dun; het bloedverlies is dan minder dan bij een natuurlijke menstruatie.


Niet alleen hormonen en de opbouw van het slijmvlies beïnvloeden het bloedverlies, ook de baarmoeder zelf speelt een rol. De baarmoeder, die de vorm en grootte van een peer heeft, bestaat uit een spierwand. Aan de binnenzijde is er de baarmoederholte. De spierwand is aan de binnenkant bekleed met slijmvlies. De wanden bekleed met het slijmvlies liggen tegen elkaar aan, zodat er eigenlijk geen echte holte is. Veranderingen in de vorm van deze 'holte' bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een poliep of een vleesboompje (myoompje) hebben nogal eens overmatig bloedverlies tot gevolg.

Ook bij een baarmoeder met veel grote myomen kan er hevig bloedverlies zijn, net zoals bij adenomyose en endometriose. Dit zijn afwijkingen waarbij het slijmvlies dat de baarmoederholte bekleedt, ook in de wand van de baarmoeder of buiten de baarmoeder aanwezig is. Bij endometriose heeft u vaak pijnlijke menstruaties.

Soms veroorzaken afwijkingen in de bloedstolling of medicijnen die de bloedstolling beïnvloeden, hevig bloedverlies.

Ook door een spiraaltje neemt het bloedverlies toe.

Bij 60% van de vrouwen vindt de gynaecoloog geen duidelijke verklaring voor het hevige bloedverlies.



Welke onderzoeken zijn mogelijk

Gynaecologisch onderzoek

Bij het gynaecologisch onderzoek bekijkt de gynaecoloog met een spreider (speculum) de baarmoedermond. Daarna wordt een inwendig onderzoek (vaginaal toucher) gedaan. Hiermee beoordeelt de arts ongeveer de grootte en de vorm van de baarmoeder. Ook zijn eventuele afwijkingen aan de eierstokken te voelen.

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek is mogelijk om bloedarmoede, ijzergebrek of afwijkingen in de bloedstolling op te sporen.

Echoscopisch onderzoek

Echoscopie is een onderzoek dat gebruik maakt van hoogfrequente geluidsgolven. Lees voor meer informatie de folder [Echografie op de afdeling Gynaecologie](#). Het onderzoek vindt plaats via de buikwand of de vagina (schede). Bij een niet al te grote baarmoeder geeft echoscopisch onderzoek via de vagina de beste informatie over eventuele afwijkingen van de baarmoeder of de eierstokken.

Hysteroscopisch onderzoek

Een hysteroscopie is een onderzoek waarbij de gynaecoloog met een dun kijkbuisje (hysteroscoop) in de baarmoeder kijkt. Lees meer informatie in de folder [Kijken in de baarmoeder \(hysteroscopie\)](#).

De gynaecoloog kan een eventueel aanwezige kleine poliep bij het hysteroscopisch onderzoek verwijderen. Als er een of meer vleesboompjes in de baarmoederholte uitpuilen, adviseert men vaak een grotere hysteroscopische operatie. Lees meer informatie in de folder [Therapeutische hysteroscopie: behandelingen in de baarmoeder](#).

Curettag

Een curettage (schoonmaken) van de baarmoeder is een kleine operatie. Met een curette (een soort lepeltje) krabt de gynaecoloog het slijmvlies dat de baarmoederholte bekleedt, weg. Deze ingreep is soms nuttig om bijvoorbeeld een poliep te verwijderen. Soms wordt het weefsel voor onderzoek niet weggekrabd maar weggezogen. Lees meer informatie in de folder [curretage](#).

Welke behandelingen zijn mogelijk

Als de gynaecoloog afwijkingen vindt die het hevige bloeden kunnen verklaren, zoals poliepen of vleesbomen in de baarmoederholte, bespreekt hij of zij met u of het mogelijk is ze te verwijderen en meet welke behandeling. Vaak adviseert de gynaecoloog dan een [hysteroscopische operatie](#).

Bij een heel grote baarmoeder met veel vleesbomen is soms een baarmoederverwijdering de enige oplossing als medicijnen onvoldoende helpen. Lees voor meer informatie de folders [Myomen](#) en [Het verwijderen van de baarmoeder](#).

Als de gynaecoloog geen duidelijke verklaring voor de hevige menstruaties vindt, zijn verschillende behandelingen mogelijk:

- behandelingen met medicijnen;
- een capsule met progesteron die in de baarmoeder wordt ingebracht;
- operatieve behandelingen van het baarmoederslijmvlies;
- verwijdering van de baarmoeder.

Bij de meeste behandelingen worden de menstruaties minder hevig en soms is er helemaal geen bloedverlies meer. Het effect van de behandeling op langere termijn is niet altijd blijvend. Het is niet altijd te voorspellen welke behandeling voor u het meest geschikt is. Meestal adviseert de gynaecoloog met de minst ingrijpende behandeling te beginnen. Verwijdering van de baarmoeder adviseren we meestal pas als laatste mogelijkheid. U kunt de voor- en nadelen van de verschillende behandelingen met de gynaecoloog bespreken.

Medicijnen: niet-hormonen

Prostaglandine-synthetase-remmers (onder andere diclofenac, ibuprofen, indometacine, naproxen)

Deze medicijnen schrijft men vaak voor om menstruatiepijn te verminderen. Minder bekend is dat ook het bloedverlies bij de menstruatie met gemiddeld 30% afneemt: meer dan de helft van de vrouwen ervaart dat de menstruaties minder hevig worden. In de bijsluiters staan veel mogelijke bijwerkingen beschreven, maar in de praktijk komen ze relatief zelden voor.

Tranexaminezuur (Cyklokapron®)

Dit middel beïnvloedt de bloedstolling en u neemt het alleen in tijdens de dagen van hevig bloedverlies. Bij de menstruatie ontstaat door het afstoten van het slijmvlies aan de binnenzijde van de baarmoeder een wondgebied. Naarmate het bloed hier sneller stolt, verliest u minder bloed. Gemiddeld neemt het bloedverlies met de helft af, en vier van de vijf vrouwen blijken tevreden. Weinig gegevens zijn bekend over tevredenheid op langere termijn. Vrouwen die ooit trombose gehad hebben, mogen dit middel niet gebruiken.

Medicijnen: hormonen

De pil

Veel vrouwen weten uit ervaring dat de menstruatie minder hevig is bij gebruik van de pil. De pil is dan vaak ook een geschikt medicijn bij klachten over hevig bloedverlies. Meestal is het resultaat goed, maar de pil biedt niet altijd uitkomst. Sommige vrouwen ervaren bijwerkingen, andere hebben emotionele tegenzin om (weer) de pil te gebruiken, vooral vrouwen die gesteriliseerd zijn, of van wie de partner zich heeft laten steriliseren.

Anders dan men een aantal jaren geleden dacht, zijn er tegenwoordig meestal weinig bezwaren tegen pilgebruik boven de 35 jaar. Voor vrouwen die de overgang naderen is er een pil met een iets andere samenstelling. Bij hoge bloeddruk of roken wordt de pil soms ontraden, alhoewel stoppen met roken dan verstandiger is voor uw gezondheid.

De prikpil

Dit is een injectie 1 keer in de 3 maanden met een relatief grote hoeveelheid progestageen hormoon. De prikpil schrijft men meestal voor als anticonceptie, maar kan ook gebruikt worden ter behandeling van hevige menstruaties. Het is de bedoeling dat de menstruaties uiteindelijk helemaal wegblijven. Vaak zijn er de eerste maanden, en soms het eerste half jaar of nog langer, klachten over langdurig, onregelmatig bloedverlies.

Niet bij elke vrouw die de prikpil gebruikt blijven de menstruaties helemaal weg. Na het stoppen met de prikpil duurt het ook vaak 1 of zelfs 2 jaar voordat de cyclus zich weer herstelt. De prikpil schrijft men daarom in verhouding zelden voor als behandeling voor hevige menstruaties.

Progesteronpreparaten

Continue gebruik van een progesteronpreparaat zoals bijvoorbeeld Orgametril® zorgt ervoor dat er geen eisprong optreedt. Daardoor blijft ook de menstruatie achterwege. Deze medicijnen moet u iedere dag innemen. Niet altijd lukt het ervoor te zorgen dat de menstruaties wegblijven. Soms treedt tussentijds bloedverlies op. Een vaak voorkomende bijwerking is vocht vasthouden en daarmee gewichtstoename. Andere mogelijke bijwerkingen zijn een vette huid, en soms depressiviteit of minder zin in vrijen. Niet elke vrouw heeft last van deze bijwerkingen.

Danazol

Dit 'antihormoon' onderdrukt de aanmaak van hormonen in de eierstokken, waardoor minder slijmvlies in de baarmoeder wordt opgebouwd en afgestoten. Meestal neemt de menstruatie in hevigheid af, en bij de meeste vrouwen verminderen de klachten. Er kunnen bijwerkingen voorkomen, zoals vocht vasthouden en een vette huid; een enkele keer ziet men ernstiger bijwerkingen. In het geval van bijwerkingen is het middel niet echt geschikt voor lang gebruik.

LH/RH-agonisten

Dit zijn medicijnen die de situatie in de postmenopauze (de periode na de laatste menstruatie) nabootsen. De eierstokken maken dan nauwelijks hormonen, zodat het baarmoederslijmvlies niet meer wordt opgebouwd en afgestoten. In verband met ongunstige effecten voor de botopbouw schrijven de meeste artsen dit medicijn liever niet langer dan een half jaar voor. Voor jongere vrouwen is deze behandeling dan meestal ook niet geschikt. Voor vrouwen rond de 50 jaar betekenen deze medicijnen nogal eens een tijdelijke oplossing; misschien komen zij na deze periode spontaan in de overgang.

Deze middelen kunnen overgangsklachten als opvliegers en nachtzweeten versterken. Zo nodig kan de gynaecoloog andere hormonen voorschrijven om deze bijwerkingen te verminderen.

Progesteroncapsule (Mirena-spiraaltje)

De arts brengt de progesteroncapsule via de vagina in de baarmoeder. Op het ogenblik is alleen het Mirena-spiraaltje op de markt; mogelijk komen er nog andere merken. De capsule geeft voor 5 jaar een progestageen hormoon af. Het baarmoederslijmvlies wordt zo minder gevoelig voor de hormonen die de eierstokken maken. Het slijmvlies blijft dun, en het bloedverlies bij de menstruatie vermindert over het algemeen sterk.

Uit onderzoek blijkt dat 75% van de vrouwen met een Mirena-spiraaltje minder hevig vloeit dan eerst, en sommige vrouwen menstrueren na langere tijd helemaal niet meer. Wel zijn er de eerste maanden na het inbrengen nogal eens buikpijnklachten, en ook moet u rekening houden met 3 tot 6 maanden 'spotting': tussentijds bloedverlies op onvoorspelbare ogenblikken.

Het Mirena-spiraaltje is niet voor elke vrouw geschikt. Vooral vrouwen die vroeger een spiraaltje spontaan zijn verloren, hebben waarschijnlijk ook meer kans dit spiraaltje te verliezen. Klachten in het verleden over abnormaal bloedverlies bij een gewoon spiraaltje hoeven bij een Mirena-spiraaltje niet terug te keren.

Operatieve behandelingen van het baarmoederslijmvlies

Behandelingen van het baarmoederslijmvlies hebben als doel het verwijderen of vernietigen van dit slijmvlies. Immers, als van dit slijmvlies weinig of niets meer over is, kan het ook niet worden opgebouwd en bij de menstruatie afgestoten. Verschillende methoden als de ballonbehandeling, de rollerbolmethode en de endometriumresectie bespreken we hier kort. Lees meer informatie in de folder [Therapeutische hysteroscopie: behandelingen in de baarmoeder](#).

Meestal doet de gynaecoloog deze operaties in dagbehandeling en onder volledige verdoving, maar soms is een ruggenprik of plaatselijke verdoving mogelijk. Soms adviseert de gynaecoloog een voorbehandeling van het slijmvlies. U krijgt dan medicijnen waardoor u tijdelijk in de overgang komt. Het baarmoederslijmvlies wordt hierdoor dunner en is gemakkelijker te verwijderen of te vernietigen. Na afloop van deze behandelingen moet u er rekenen op een aantal weken vieze, soms stinkende afscheiding. Pijn is er meestal alleen de eerste dag na de operatie.

Een zwangerschap raadt men na een deze ingreep ten sterkste af. Voor deze behandelingen geldt dat het bij ongeveer 4 van de 5 vrouwen helpt. Zij menstrueren duidelijk minder en bij een klein deel houdt de menstruatie helemaal op. Op langere termijn groeit het baarmoederslijmvlies nogal eens weer aan. Herhaling van de behandeling na een aantal jaren kan dan nodig zijn.

Operatieve verwijdering van de baarmoeder (hysterectomie of uterusexirpatie)

Verwijdering van de baarmoeder adviseert de gynaecoloog meestal pas als andere behandelingen niet het gewenste resultaat opleveren. Soms wordt een dit advies eerder gegeven, bijvoorbeeld in het geval van een baarmoeder met zeer veel myomen die de hevige menstruaties veroorzaken. Lees voor meer informatie de folders [Myomen](#) en [Het verwijderen van de baarmoeder](#).

Zelfhulporganisaties

Stichting Voorlichting Zelfhulp Gynaecologie (VZG)

Nieuwegracht 24 A, 3521 LR Utrecht

T (030) 231 05 58 (ma. t/m vr. van 09.30 – 12.30 uur)

F (030) 231 05 58

Verder lezen

Op het patiëntenplatform van de NVOG kunt u meer informatie lezen over de diverse onderwerpen. Ga hiervoor naar www.degynaecoloog.nl of vraag naar folders van de NVOG bij Patiëntenvoorlichting in de centrale hal van het ziekenhuis of op de polikliniek Gynaecologie.

Woordenlijst

<i>Adenomyose</i>	baarmoederslijmvlies dat in de baarmoederspier gegroeid is
<i>Anti-hormoon</i>	een synthetisch hormoon dat de aanmaak van eigen hormonen beïnvloedt
<i>Ballonmethode</i>	operatie waarbij de gynaecoloog een ballon met hete vloeistof in de baarmoeder brengt; de hete ballon verschroeit het baarmoederslijmvlies
<i>Curettag</i>	kleine operatie waarbij de gynaecoloog het baarmoederslijmvlies met een dun lepeltje weg schraapt ('schoonmaken' van de baarmoeder)
<i>Endometriose</i>	baarmoederslijmvlies dat zich bevindt op een andere plaats dan in de baarmoeder
<i>Endometrium</i>	baarmoederslijmvlies
<i>Endometriumresectie</i>	operatie waarbij de gynaecoloog het baarmoederslijmvlies verwijdert
<i>Hysteroscopie</i>	een onderzoek waarbij de gynaecoloog met een dun buisje in de baarmoeder kijkt
<i>Hysteroscopische operatie</i>	operatie via een dun buisje dat de gynaecoloog in de baarmoeder brengt
<i>Menstruatie</i>	maandelijkse bloeding
<i>Menstruatiecyclus</i>	de tijd die verloopt tussen de eerste dag van 2 menstruaties

<i>Myoom</i>	een goedaardige spierknobbel die uitgaat van de wand van de baarmoeder
<i>Oestrogeen</i>	vrouwelijk hormoon uit de eierstokken
<i>Overgang</i>	de periode rond de laatste menstruatie (gewoonlijk rond het 52e levensjaar)
<i>Poliep</i>	een gezwelletje dat in de baarmoederholte groeit; bijna altijd is het goedaardig
<i>Post-menopauze</i>	de periode na de laatste menstruatie; gemiddeld begint deze rond het 52e jaar
<i>Progesteron</i>	vrouwelijk hormoon uit de eierstokken
<i>Progestageen</i>	medicijn dat dezelfde eigenschappen heeft als het door het lichaam gemaakte progesteron
<i>Rollerbolmethode</i>	operatie waarbij het baarmoederslijmvlies met een verhit bolletje verschroeid wordt
<i>Trombose</i>	vorming van stolsel in een bloedvat
<i>Uterus</i>	baarmoeder
<i>Uterusextirpatie</i>	verwijdering van de baarmoeder
<i>Vleesboom</i>	myoom

Beslissing over behandeling

Hevig bloedverlies is een vervelende klacht, maar bijna nooit levensbedreigend. U hebt dus tijd om er goed over na te denken welke behandeling voor u het beste is.

Vragen

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met uw behandelend arts of huisarts. U kunt de polikliniek Gynaecologie bereiken via (010) 291 22 80.

©NVOG

Notities



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11
l: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasnik.nl (kinderwebsite)
l: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

