

# PATIËNTEN INFORMATIE

## Pterygium

**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over diagnose pterygium (vleugeltje) en de eventuele behandeling hiervan. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

### **Wat is een pterygium**

De oogarts heeft bij u een pterygium vastgesteld. Dit is een plooi van het slijmvlies die meestal vanuit de ooghoek aan de neuszijde langzaam over het hoornvlies groeit. De plooi krijgt daarbij de vorm van een langwerpige driehoek, een 'vleugeltje'. Hoe een pterygium ontstaat is niet helemaal duidelijk. Mogelijk bestaat er een relatie met verhoogde blootstelling aan zonlicht, hitte, droogte en stof.

### **Klachten**

Een pterygium geeft vaak klachten zoals een rood oog, een branderig gevoel en tranen. Ook kan het als cosmetisch storend worden ervaren. Wanneer het pterygium groeit kan het uiteindelijk tot voor de pupilopening komen en daardoor het gezichtsvermogen verminderen.

### **Behandeling**

Bij een klein pterygium wordt vaak geprobeerd, met behulp van medicatie, het gevoel van irritatie te verminderen. Wanneer het groter is of groter groeit, wordt een operatie geadviseerd. Dit is de enige manier om het te verwijderen.

### **Preoperatieve screening**

Voordat u geopereerd wordt, krijgt u een formulier mee voor een preoperatieve screening. Deze neemt u ingevuld mee op de dag van de operatie. De operatie vindt bijna altijd plaats op de afdeling Dagbehandeling. Praktische informatie vindt u in het [opnameboekje](#) [Dagverpleging](#).

Ook krijgt u een recept mee omdat u het geopereerde oog moet behandelen met een zalf tot aan de eerste controle bij de oogarts.

Wanneer u geopereerd wordt onder volledige verdoving dan wordt u doorverwezen naar de anesthesioloog voor een intakegesprek. Hij of zij bespreekt met u onder andere de gang van zaken rondom de operatie en registreert uw medicatiegebruik.

### **Vorbereiding op de operatie**

U mag op de dag van de operatie geen oog make-up, nagellak of sieraden dragen. Als u een hoortoestel draagt moet u deze, aan de kant van het geopereerde oog, uitdoen.

### **Verdoving**

Er zijn 2 soorten verdoving mogelijk bij deze operatie: plaatselijk of volledig.

- Bij plaatselijk verdoving wordt alleen uw oog verdoofd. U blijft tijdens de operatie bij bewustzijn maar u ervaart geen pijn.
- Bij volledige verdoving (narcose) krijgt u een slaapmiddel door middel van een infuus toegediend. U valt in slaap en wordt pas na afloop van de operatie weer wakker.

Zie ook de film over anesthesie op [www.maasstadziekenhuis.nl/filmanesthesie](http://www.maasstadziekenhuis.nl/filmanesthesie).

### **Tijdens de operatie**

Tijdens de operatie wordt de driehoekige slijmvliesplooï verwijderd. Vervolgens wordt het hoornvliesoppervlak gepolijst en wordt er een nieuw laagje slijmvlies aangebracht. Dit slijmvlies wordt van hetzelfde oog geprepareerd, meestal van achter het bovenooglid. Het laagje slijmvlies wordt vastgezet met hechtingen die binnen drie tot vier weken vanzelf oplossen.

De operatie duurt ongeveer 45 minuten.

Door een nieuw laagje slijmvlies aan te brengen neemt de kans op herhaalde groei (recidief) van het pterygium af tot ongeveer 1%. Bij een zeer klein pterygium kan de oogarts samen met u beslissen om geen nieuw laagje slijmvlies aan te brengen, maar het aldaar aanwezig slijmvlies te gebruiken.

### **Na de operatie**

Na de operatie mag u in principe naar huis. Het oog is nog zeer kwetsbaar voor stoten en wrijven, u krijgt daarom ter bescherming een plastic oogkapje voor het geopereerde oog. Hierdoor kunt u diepte en afstanden tijdelijk niet goed inschatten.

U mag na de operatie dus niet zelf actief deelnemen aan het verkeer. Wij vragen u een begeleider mee te nemen die u na de operatie naar huis brengt.

Na de operatie moet uw oog 3 keer per dag worden gezalfd en bij de nacontrole adviseert uw oogarts u verder hierin. Ook vragen wij u om 1 week lang voor het slapen gaan het plastic oogkapje weer voor het geopereerde oog te plakken.

Patiënten die voor de operatie al druppelden met oogdrukverlagende oogdruppels moeten hiermee doorgaan na de operatie, behalve u daarover nadrukkelijk anders bent geadviseerd door uw oogarts.

### **Leefregels**

Na de operatie geldt een aantal leefregels:

- Verwijder de dag na de operatie het kapje. Bewaar het kapje zodat u deze de 1e week na de operatie voor het slapen kunt dragen ter bescherming van het oog.
- Begin de dag na de operatie met de voorgeschreven oogzalf, 3 keer per dag in het geopereerde oog tot de 1e controle na de operatie. Deze medicatie bevat antibiotica en is ook ontstekingsremmend.

- Draag bij zonnig weer de eerste 2 weken buitenshuis een zonnebril.
- Wrijf de eerste 2 maanden niet in uw oog. U kunt gerust douchen en haren wassen zonder extra bescherming.
- Lichamelijke inspanning, sporten en zwemmen mogen na 2 weken hervat worden.
- Gebruik de eerste 2 weken geen oog make-up.

Bij twijfel kunt u dit met uw oogarts overleggen.

### **Mogelijke klachten**

- De dagen na de operatie kunnen er rood gekleurde tranen uit het oog komen.
- Het oog is meestal de eerste 3 weken wat pijnlijk en lichtgevoelig, onder andere door de aanwezigheid van hechtingen. De hechtingen verdwijnen op den duur vanzelf uit het oog.
- De oogleden kunnen een aantal dagen gezwollen zijn. Het slijmvlies van het oog is in de ooghoek gezwollen en lijkt op een blaasje.
- De roodheid, als gevolg van de operatie, verdwijnt meestal pas na 4 tot 6 weken.

U kunt in overleg met uw arts 3 tot 4 keer per dag paracetamol (500 mg) tegen de pijn gebruiken.

### **Controles**

De 1e controle vindt ongeveer 1 week na de operatie plaats en de 2e controle vindt ongeveer 1 maand na de operatie plaats. Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde.

### **Vragen**

De informatie in deze folder is niet specifiek maar algemeen. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stelt u deze dan aan uw behandelend oogarts of neem contact op met de polikliniek Oogheelkunde via (010) 291 22 40.

Deze folder is tot stand gekomen met dank aan het Nederlands oogheeskundig gezelschap (NOG), [www.oogheekunde.org](http://www.oogheekunde.org).







De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،  
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه  
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl) / [www.maasnik.nl](http://www.maasnik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

