

# PATIËNTEN INFORMATIE

Gastroduodenoscopie en  
pneumodilatatie

**MAASSTAD  
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis





In deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informatie geven over het onderzoek, de voorbereiding en de nazorg. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

### **Doel van het onderzoek**

Bij een gastroduodenoscopie wordt het slijmvlies (de binnenbekleding) van de slokdarm, de maag en het eerste deel van de twaalfvingerige darm bekeken met behulp van een endoscoop. Een endoscoop is een dunne flexibele slang met aan het uiteinde een kleine videocamera. Tijdens dit onderzoek kan de, bij u bestaande, vernauwing worden opgerekt door middel van een ballon waardoor betere passage van voeding mogelijk is.

### **Vorbereiding**

- U volgt 48 uur voor de behandeling een vloeibaar dieet, bijvoorbeeld vla, pap of soep zonder groenten, vlees en vermicelli.
- U mag minimaal 12 uur voor het onderzoek niets meer eten, drinken en/ of roken.
- Als u al sondevoeding krijgt dan moet deze gestopt worden.

### **Medicijnen**

- Als u bloedverduunners gebruikt krijgt u hier aparte informatie voor.
- als u diabetespatiënt bent overleg dan van vooraf met uw behandelend arts over het beleid. Uw overige medicijnen mag u innemen zoals u gewend bent.

**Let op** Als u zwanger bent, kan het onderzoek alléén plaatsvinden in overleg met de MDL-arts. Meld dit op tijd aan uw behandelend arts.

## **Dag van het onderzoek**

Op de dag van het onderzoek meldt u zich 30 minuten voor de afspraak bij de balie van het MDL-centrum (bouwdeel L, verdieping 1). U wordt binnengeroepen door een verpleegkundige van de uitslaapruijnte waar u wordt voorbereid op het onderzoek. U krijgt hier een infuusnaaldje. Tijdens het onderzoek kunt u het beste gemakkelijk zittende kleding dragen of een pyjama.

## **Het onderzoek**

U wordt binnengeroepen en begeleid door de endoscopie-assistente/verpleegkundige. Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u een cupje met Infacol te drinken, dit is om schuimvorming in de maag tegen te gaan.

In opdracht van de arts wordt eventueel de keel verdoofd met een verdovende spray, u kan het gevoel hebben alsof de keel dikker wordt maar dit is in werkelijkheid niet zo. De keelverdooving vermindert de kohlals reflex.

Tijdens het onderzoek moet u op uw linkerzijde gaan liggen. Om eventuele beschadigingen aan uw gebit of de endoscoop te voorkomen moet u als u gebitsprothese heeft dit uit te doen. Wanneer u geen gebitsprothese heeft krijgt u een bijtring in de mond.

Via de mond brengt de arts de endoscoop voorzichtig in de slokdarm, de maag en de twaalfvingerige darm. Om een goed overzicht te krijgen is het nodig dat er lucht wordt ingeblazen, dit kan een drukkend gevoel geven in de buik. Het kan ook zijn dat u hierdoor gaat boeren. Er wordt een voerdraad tot achter de vernauwing opgevoerd. Dit wordt door middel van doorlichting met röntgenstralen gecontroleerd. Hier overheen kan de arts de ballon opvoeren en de vernauwing stapsgewijs oprekken.

Het onderzoek duurt inclusief de voorbereiding ongeveer 30 minuten.

### Na het onderzoek

- Het kan zijn dat de keel wat gevoelig is, maar dit zakt vrij snel weer af.
- Tot 2 uur na het onderzoek moet u nuchter blijven, u mag dan niets eten, drinken en/of roken.
- Na 2 uur mag u alleen slokjes water, hierna mag u langzaam uitbreiden.
- U krijgt de folder '[Nazorg na dilatatie](#)' mee naar huis.

### Zijn er risico's aan het onderzoek verbonden?

Een luchtweginfectie of longontsteking kan optreden als u zich verslikt in de maaginhoud. Dit kan gebeuren wanneer u **niet** nuchter bent. Soms kan er een bloeding of een gaatje in de slokdarm ontstaan waarvoor verdere medische behandeling noodzakelijk is.

### De uitslag

Het resultaat van de behandeling wordt door uw behandelend arts bij de eerstvolgende afspraak besproken.

### Vragen

Heeft u nog vragen over dit onderzoek, of mocht u na het onderzoek en/of ingreep klachten krijgen die misschien te maken kunnen hebben met het onderzoek en/of ingreep dan kunt u contact opnemen met de balie van het Maag-, Darm en Levercentrum van het Maasstad Ziekenhuis via (010) 291 17 77.

In dringende gevallen, na 17.00 uur en op zaterdag en zondag , kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts-assistent Interne Geneeskunde. Deze is bereikbaar via de telefoniste van het Maasstad Ziekenhuis via (010) 291 19 11.







De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،  
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه  
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis  
Maasstadweg 21  
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: [www.maasstadziekenhuis.nl](http://www.maasstadziekenhuis.nl) / [www.maasnik.nl](http://www.maasnik.nl) (kinderwebsite)

I: [www.maasstadziekenhuis.nl/mijn](http://www.maasstadziekenhuis.nl/mijn) (patiëntenportaal)

