

PATIËNTEN INFORMATIE

Plexus coeliacus- of splanchnicusblokkade

Blokkade van een zenuwnetwerk in de bovenbuik

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder willen u informeren over de behandeling Plexus coeliacus- of splanchnicusblokkade.

Doel van de de behandeling

Het doel van de behandeling is de pijn te verminderen waardoor mogelijk het gebruik van pijnmedicatie kan worden verminderd. Dit wordt gedaan door het zenuwnetwerk in de bovenbuik te blokkeren.

Algemene informatie

Deze behandeling kan worden toegepast bij ernstige pijnklachten door kanker of chronische ontsteking van organen in de bovenbuik, zoals de alvleesklier, de maag en de lever.

Het gaat hier om een blokkade van een zenuwnetwerk in de bovenbuik (de plexus coeliacus). Bij de meerderheid van de patiënten treedt een goede pijnvermindering op. Het effect van de blokkade houdt gemiddeld een aantal maanden aan. U moet rekenen op een ziekenhuisopname van 24 uur, u verblijft meestal 1 nacht in het ziekenhuis.

Vorbereiding

U mag voor de behandeling niet eten of drinken. U krijgt hier instructies over bij de preoperatieve screening.

Bloedverdunners

De anesthesioloog heeft met u het volgende afgesproken:

- U stopt ____ dag(en) voor de behandeling met het gebruik van de aangekruiste medicijnen:
 - NSAID zoals _____
 - acetylsalicylzuur/ carbasalaatcalcium (Ascal)
 - clopidogrel (Plavix/Grepid)/ pasugrel (Efient)/ ticrigrelor (Brilique)
 - dopydiramol (Persantin)
 - acenocoumarol (Sintrom)
 - marcoumar/ fenprocoumon
 - DOAC (dabigatran, rivaroxaban, apixaban)
 - overig, zoals _____

- U laat wel/niet 1 uur voor aanvang van de behandeling bloed afnemen, u krijgt hiervoor een labformulier mee

Na de behandeling krijgt u instructies over het herstarten van uw bloedverdunnende medicatie. Als u bloedverdunnende medicatie krijgt voorgeschreven via de trombosedienst of het Star-MDC moet u deze organisatie zelf informeren over het stoppen en hervatten van de medicatie. U krijgt hiervoor een brief mee.

In het ziekenhuis

Op de dag van de behandeling meldt u zich bij Bureau Opname in de centrale hal en wordt u naar de verpleegafdeling gebracht. De verpleegkundige geeft u uitleg over de afdeling en wijst u uw kamer. Op de afgesproken tijd krijgt u een operatiejasje aan en u wordt in een bed naar de operatiekamer gereden.

Behandeling

U wordt daar eerst ontvangen in de zogenaamde holding. Op de holding krijgt u een infuus. Hierna wordt u naar de behandelkamer/operatiekamer gebracht. Op de behandelkamer is naast de behandelend arts ook een anesthesiemedewerker, een operatieassistente, een verpleegkundige en een röntgenassistente aanwezig.

U wordt aangesloten op een bewakingsmonitor, waarmee we u tijdens de ingreep goed in de gaten kunnen houden. De arts bepaalt onder röntgendoorlichting nauwkeurig de plaats, verdooft de huid en plaatst vervolgens de naald. Als de naaldpunt op de juiste plaats staat, wordt er medicatie ingespoten ter blokkering van de zenuw. De gehele ingreep duurt ongeveer 45-60 minuten.

U wordt op een bed geholpen en naar de uitslaapkamer /recovery gereden. Hier worden een aantal controles bij u gedaan. Als u zich goed voelt gaat u terug naar de afdeling.

Napijn

Het kan voorkomen dat u na de behandeling napijn heeft. Vaak merkt u direct na de behandeling al effect. In overleg met uw behandelend arts wordt bekeken of en hoe u de pijnmedicatie kan verlagen.

Complicaties

De behandeling wordt zorgvuldig uitgevoerd; ondanks dat bestaat er een kleine kans op

complicaties.

- Als zeer zeldzame complicatie wordt een dwarslaesie (gedeeltelijke verlamming) beschreven. De kans dat dit optreedt is heel erg klein.
- De functie van de blaas kan in een aantal gevallen verminderen, waardoor een blaaskatheter noodzakelijk kan zijn. Ook deze complicatie is relatief zeldzaam.
- Het tijdelijk optreden van diarree is een normaal verschijnsel na deze blokkade.

Resultaat

Het resultaat van deze behandeling wordt pas na 1 tot 2 dagen duidelijk.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u deze stellen aan de verpleegkundige. U kunt u vraag stellen via:

- Een e-consult op het patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis. U kunt met uw DigiD inloggen via onze website www.maasstadziekenhuis.nl/mijnmaasstadziekenhuis.
- De app BeterDichtbij (als u dit heeft geactiveerd). Lees meer over BeterDichtbij op www.maasstadziekenhuis.nl/beterdichtbij.nl.
- Het telefonisch verpleegkundig spreekuur van de Pijnkliniek op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 09.00 - 11.00 uur op telefoonnummer (010) 291 23 61.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية، إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بمصنوع شخص ما الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه أو يشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

