

PATIËNTEN INFORMATIE

Tocilizumab (RoActemra®) infuus of injecties

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Met deze folder willen we u informeren over de behandeling met het middel tocilizumab. Het doel van een behandeling met tocilizumab is het ontstekingsproces tot rust te brengen.

Werking van tocilizumab

Tocilizumab is een zogenaamde 'biological', het is een medicijn dat ontwikkeld is dankzij moderne technologie.

Tocilizumab is een antilichaam gericht tegen de interleukine-6 (IL-6) receptor. Interleukine-6 is een eiwit dat geproduceerd wordt door bepaalde witte bloedcellen. Het speelt een belangrijke rol bij het op gang brengen en onderhouden van ontstekingen. Bij een aantal reumatische aandoeningen is er een teveel aan IL-6. Tocilizumab blokkeert IL-6 waardoor ontstekingsklachten afnemen. Tocilizumab kan ervoor zorgen dat de pijn en zwelling in uw gewrichten afnemen en uw gewrichten op de lange termijn minder schade oplopen.

Wanneer wordt tocilizumab voorgeschreven?

- Tocilizumab wordt (meestal in combinatie met methotrexaat) gebruikt voor de behandeling van actieve reumatoïde artritis en vasculitis.
- Tocilizumab kan voorgeschreven worden aan patiënten bij wie andere geneesmiddelen tegen reumatoïde artritis onvoldoende effect hadden.

Voor de start van de behandeling met tocilizumab moet onderzocht worden of u in aanmerking komt voor de behandeling en of de behandeling voor u veilig is. Dit houdt in dat u gescreend wordt op een doorgemaakte TBC en hepatitis infectie in het verleden.

Het gebruik van tocilizumab

Het toedienen van tocilizumab vindt plaats op de dagbehandeling van het ziekenhuis en gebeurt met een infuus. Het infuus duurt ongeveer 1 tot 2 uur. De dosering is afhankelijk van het lichaamsgewicht.

Tocilizumab wordt 1 keer per 4 weken toegediend.

Tocilizumab kan ook als injectie worden toegediend. U leert om uzelf te injecteren met een voorgevulde spuit. Dat moet 1 keer per week gebeuren.

Het effect van tocilizumab treedt gewoonlijk enkele weken na het starten van de behandeling op.

Controle

- Tijdens het infuus worden uw bloeddruk, hartfrequentie en temperatuur gecontroleerd.
- Tijdens de behandeling met tocilizumab wordt regelmatig bloed afgenomen voor controle van onder andere de aanmaak van bloedlichaampjes, de leverfunctie, nierfunctie en het in de eerste maanden ook het cholesterol gehalte.

U kunt de uitslagen van het bloedonderzoek zelf bekijken als u inlogt op [Mijn Maasstad Ziekenhuis](#).

Bijwerkingen van tocilizumab

- Mogelijke bijwerkingen/reacties tijdens het inlopen van het infuus zijn: hoofdpijn, huiduitslag en bloeddrukverhoging. Tijdens het infuus wordt u dan ook nauwlettend in de gaten gehouden door een arts of verpleegkundige. Mocht u last krijgen van een ongewenste reactie of bijwerking, dan kan de toediening van tocilizumab vertraagd of onderbroken worden. Als het nodig is, wordt een anti-allergiemiddel toegediend.

- Op de plaats waar u zichzelf injecteert, kan een lichte roodheid of een kleine blauwe plek ontstaan. Wij adviseren u om de injectieplaats af te wisselen. Als u zich afvraagt of u de juiste injectietechniek toepast, neem dan contact op met de polikliniek.
- Patiënten die met tocilizumab behandeld worden, hebben een iets grotere kans op infecties. Neem daarom altijd de temperatuur op wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie, bijvoorbeeld een pussend wondje, contact op met de polikliniek.

Zwangerschap en borstvoeding

Over het gebruik van tocilizumab tijdens zwangerschap zijn onvoldoende gegevens bekend om de veiligheid te kunnen beoordelen. Bent u (onverwacht) zwanger, overweegt u een zwangerschap of wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw reumatoloog.

Vaccinaties

De griepvaccinatie (griep prik) wordt geadviseerd en mag worden toegediend tijdens het gebruik van tocilizumab.

Overweegt u een verre reis te maken waarvoor vaccinaties noodzakelijk zijn, overleg dan eerst met uw behandelaar. Vaccinaties met levende vaccins worden afgeraden.

Operaties en andere ingrepen

Bij het gebruik van tocilizumab bestaat er een verhoogd risico op infecties en een vertraagde wondgenezing na een operatie. Daarom wordt meestal geadviseerd rondom een geplande (grote) operatieve ingreep, 2 weken vooraf geen tocilizumab meer toe te dienen en te herstarten als de wond genezen is. Overleg met uw reumatoloog als u geopereerd gaat worden.

Gebruik van tocilizumab samen met andere medicijnen

Licht uw arts in over uw behandeling met tocilizumab. Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Vragen?

Heeft u dringende vragen neem dan contact op met de polikliniek Reumatologie via (010) 291 22 05.

- Onze baliemedewerkers zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar op dit telefoonnummer.
- Onze doktersassistenten zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 11.30 uur op ditzelfde telefoonnummer te bereiken voor dringende medisch inhoudelijke vragen.

Heeft de vraag **geen spoed**? Stel dan uw vraag via:

- Een e-consult op het patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis. U kunt met uw DigiD inloggen via onze website www.maasstadziekenhuis.nl/mijnmaastadziekenhuis.
- De app BeterDichtbij (als u dit heeft geactiveerd). Lees meer over BeterDichtbij op www.maasstadziekenhuis.nl/beterdichtbij.nl.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasnik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

