

PATIËNTEN INFORMATIE

Jyseleca® (filgotinib)

**MAASSTAD
ZIEKENHUIS**

een santeon ziekenhuis



Uw reumatoloog heeft u Filgotinib voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Het is belangrijk dat u deze informatie en de bijsluiter van de apotheek goed doorleest.

Werking filgotinib

Als u een vorm van ontstekingsreuma hebt, is er een fout in uw afweersysteem ontstaan. Een afweersysteem, ook wel immuunsysteem genoemd, verdedigt je tegen ziektes en zorgt dat je niet snel ziek wordt. Uw afweersysteem is ontregeld en slaat als het ware 'op hol'. Uw lichaam denkt dat goede (lichaamseigen) cellen kwade indringers zijn en uw afweersysteem wil die indringers verdrijven. Hierdoor komen bepaalde stoffen vrij waardoor ontstekingen ontstaan in gewrichten, pezen, spieren of organen. Dit kan in verschillende plaatsen van het lichaam gebeuren. Bij reumatische aandoeningen zijn dit vaak de gewrichten.

Filgotinib is een medicijn dat deze afweerreactie onderdrukt en behoort tot de zogenaamde JAK (Janus-kinase) remmers. Filgotinib remt specifieke signalen in de cel waardoor de productie van ontstekingsfactoren afneemt. Hierdoor vermindert de pijn, zwelling en stijfheid van uw gewrichten waardoor er op langere termijn minder kans op gewrichtsschade is. Het duurt meestal een aantal weken tot maanden voordat filgotinib werkt. Bij sommige mensen werkt het medicijn helaas niet of onvoldoende.

Wanneer wordt filgotinib voorgeschreven

Uw arts schrijft u filgotinib voor als u reumatoïde artritis hebt.

Het gebruik van Filgotinib

- Filgotinib is verkrijgbaar in tabletten van 100 en 200 mg, dit wordt gegeven in een dosering van 1 keer per dag. Uw arts spreekt met u af welke dosering u gaat gebruiken.

- U kunt de tabletten het beste tijdens de maaltijd met een glas water innemen, zo verminderd u de kans op bijwerkingen. Slik elke tablet in zijn geheel door.
- Wanneer u een dosis vergeet, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Behalve als u een hele dag (24 uur) geen dosis heeft ingenomen, sla de vergeten dosis dan over en neem 1 dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.
- Als uw aandoening rustig is, bespreekt uw arts samen met u om de dosering te verlagen en als het kan de Filgotinib zelfs te stoppen

Hoe bewaart u filgotinib?

Bewaar het potje op kamertemperatuur (niet in koelkast of vriezer). Controleer de vervaldatum op de verpakking.

Controles

Voordat u begint met filgotinib wordt er eerst gekeken of u geen (sluimerende) infectie hebt. Denk aan tuberculose (TBC) of een leverontsteking (hepatitis). Om tuberculose uit te sluiten krijgt u een Mantoux-test en een bloedonderzoek en een röntgenfoto van de longen.

Tijdens behandeling met medicijnen zoals filgotinib is in het verleden bij sommige patiënten tuberculose opgetreden. Dit ging bijna altijd over een opvlaming van een oude infectie.

De Mantoux-test is een klein prikje in uw arm. Na 2-3 dagen wordt uw arm gecontroleerd om te kijken hoe uw huid reageert op het prikje.

Als u start met filgotinib laat uw arts uw bloed (in het begin) regelmatig controleren via het bloedprikken. Zo kan uw arts goed in de gaten houden hoe uw lichaam reageert op filgotinib. Ook bij verandering van dosering vindt er extra bloedonderzoek plaats.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen

Filgotinib gebruikt u bij reumatoïde artritis bij voorkeur in combinatie met methotrexaat of een ander reuma remmend medicijn. Deze combinatie is meestal effectiever.

Filgotinib kunt u niet samen gebruiken met andere immunosuppressiva zoals azathioprine, biologicals of andere JAK-remmers.

Het is verstandig altijd aan uw arts en uw apotheker te vertellen welke medicijnen u gebruikt of als er iets aan uw medicijngebruik verandert.

Mogelijke bijwerkingen

Hieronder leest u welke belangrijke bijwerkingen kunnen voorkomen bij filgotinib.

- Infecties zoals gordelroos, longontsteking of blaasontsteking. Als u deze klachten hebt, neem dan contact op met uw (huis)arts.
- Bijwerkingen van organen: bijwerkingen die u zelf niet merkt maar uw arts via bloedonderzoek wel in de gaten houdt. Het gaat om leverfunctietests, nierfunctietests, verhoogd cholesterol en afwijkingen in het bloedbeeld
- Duizeligheid en misselijkheid.
- Allergische reacties: wanneer u overgevoelig bent voor filgotinib kunt u een allergische reactie krijgen. Denk aan huidafwijkingen, koorts of benauwdheid. Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw huisarts, reumaverpleegkundige en/of behandelaar.

Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Er is weinig informatie over de effecten van filgotinib tijdens zwangerschap. Filgotinib mag u daarom niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Het is niet bekend of dit geneesmiddel in de moedermelk overgaat daarom mag u geen borstvoeding geven als u filgotinib gebruikt.

Hebt u een kinderwens of bent u (onverwacht) zwanger, vertel dit dan aan uw arts. Uw arts beslist dan samen met u wat u het beste aan uw medicijngebruik kunt veranderen als dat nodig is

Aanvullende informatie

- *Alcohol*: Er is geen bezwaar als u (1 glas) alcohol gebruikt tijdens behandeling met filgotinib.
- *Autorijden*: Er is geen bezwaar tegen autorijden tijdens gebruik van filgotinib.
- *Operaties en andere (tandheelkundige) ingrepen*: Gaat u naar de tandarts voor een ingreep of wordt u geopereerd? Geef dan aan dat u filgotinib gebruikt omdat er misschien een verhoogd risico op infecties is na een operatie. Overleg met uw behandelaar of het nodig is filgotinib tijdelijk te stoppen. Wij adviseren om uw (tand) arts op de hoogte te brengen dat u filgotinib gebruikt zodat deze zo nodig maatregelen kan nemen.
- *Reizen*: Filgotinib mag mee in uw handbagage. Bewaar de filgotinib op uw verblijfadres zoals thuis. Bij reizen: naar het buitenland is het raadzaam een actueel overzicht van uw medicijnen mee te nemen, het medicijnpaspoort. Dit paspoort kunt u krijgen bij uw apotheek.
- *Vaccinaties*: Als u begint met filgotinib raadt uw behandelend arts u waarschijnlijk aan om ieder jaar een grieprik te nemen omdat u door filgotinib kwetsbaarder bent voor infecties zoals de griep.

Heb u een andere vaccinatie dan de griep nodig?

Overleg dan altijd van tevoren met uw specialist, apotheker of huisarts.

Hebt u plannen om in de (nabije) toekomst een verre reis te maken? Als u op reis gaat hebt u soms een inenting nodig.

Gebruikt u filgotinib dan is een inenting met een levend vaccin af te raden. Denk aan het bof-mazelen-rode hond-(BMR), gele koorts- of poliovaccin.

Overleg met uw arts wanneer voor u het beste moment is om u te laten vaccineren/inenten. Eventueel moet u dan (tijdelijk) stoppen met uw medicatie. Het is verstandig dit ruim van tevoren te regelen.

Vragen?

Heeft u **dringende vragen** neem dan contact op met de polikliniek Reumatologie via (010) 291 22 05.

- Onze baliemedewerkers zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar op dit telefoonnummer.
- Onze doktersassistenten zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 11.30 uur op ditzelfde telefoonnummer te bereiken voor dringende medisch inhoudelijke vragen.

Heeft de vraag **geen spoed**? Stel dan uw vraag via:

- Een e-consult op het patiëntenportaal Mijn Maasstad Ziekenhuis. U kunt met uw DigiD inloggen via onze website www.maasstadziekenhuis.nl/mijnmaastadziekenhuis.nl.
- De app BeterDichtbij (als u dit heeft geactiveerd). Lees meer over BeterDichtbij op www.maasstadziekenhuis.nl/beterdichtbij.nl.



De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

المعلومات المتواجدة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كنتم تواجهون صعوبة في اللغة الهولندية،
إحرصوا حينئذ على أن تقرأوا هذا المنشور بحضور شخص ما، الذي يترجم لك المعلومات الواردة فيه
أو بشرحها لكم.

Maasstad Ziekenhuis
Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam

T: (010) 291 19 11

I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maaseniik.nl (kinderwebsite)

I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)

